

430 Verderón común



Verderón común. Primavera. Macho. 13 de junio.

VERDERÓN COMÚN (*Carduelis chloris*)

IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. Color verde oliváceo, con pico fuerte y claro; franja alar y laterales de la cola amarillos; **juveniles** más apagados y moteados en vientre y dorso

ESPECIES SIMILARES

De las especies con colores verdes y amarillos, el **lúgano** y **verderón serrano** presentan amplias bandas amarillas en las alas; el **verdecillo** es de un tamaño mucho menor (11-12 cm.)



Arriba izquierda verdecillo; arriba derecha lúgano; izquierda verderón serrano

SEXO

Es posible sexar a los juveniles recién salidos del nido: en los **machos**, el amarillo de las primarias 8 a 6 y el de las rectrices externas llega hasta el raquis. En las **hembras**, el amarillo de las primarias 8 a 6 y el de las rectrices externas no llega hasta el raquis. Después de la muda **postjuvenil**, **machos** con colores amarillos y verdes más vivos; dorso liso; las **hembras** tienen un color más apagado y fino barreado en el dorso.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con aspecto parecido al de las hembras, pero con colores muy apagados y barreado en el dorso y partes inferiores; plumaje nuevo.


1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas de la cola cambiadas (redondeadas) o retenidas (puntiagudas por desgaste) y entre las grandes coberteras mudadas y retenidas; si han cambiado todas las grandes coberteras hay que buscar el contraste de muda en terciarias o entre plumas del álula y coberteras primarias o entre primarias renovadas de forma excéntrica; coberteras primarias marronáceas y sin punta gris.

Adultos con las plumas de la cola (redondeadas) y ala de la misma generación, sin contrastes; coberteras primarias con borde verde y punta gris.

CUIDADO: hay **juveniles** que realizan una muda **postjuvenil** completa.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada entre octubre y noviembre. Muda **postjuvenil** frecuentemente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y la mayor parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras y terciarias, llegando en algunos a ser una muda completa.; es frecuente también cambiar el par central de la cola, si bien puede ser mudada completamente. La muda **postjuvenil** puede durar hasta noviembre dependiendo de la fecha de nacimiento.



Verderón común. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, recibándose migrantes en invierno. Repartido por toda la Comunidad, falta únicamente en las zonas altas del Pirineo y áreas deforestadas de la Depresión del Ebro.

430 Verderón común



Verderón común. Primavera. Hembra (13-VI).



Verderón común. Invierno. Hembra (03-XI).



Verderón común. Primavera. Juvenil. Hembra (21-VI).



Verderón común. Invierno. Macho (03-XI).



Verderón común. Primavera. Juvenil. Macho (09-VII).



Verderón común. Extensión del amarillo junto al raquis de las primarias 6 a 8: arriba macho; abajo hembra.




430 Verderón común



Verderón común. Extensión del amarillo en la cola: izquierda macho (06-VI); derecha hembra (06-VI).




Verderón común. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba izquierda macho (02-VI); arriba derecha hembra (30-IV); izquierda juvenil (09-VII).





Verderón común. Primavera. Diseño del capirote: arriba izquierda macho (02-VI); arriba derecha hembra (06-VI); izquierda juvenil (09-VII).




Verderón común. Invierno. Diseño del pecho: izquierda macho (03-XI); derecha hembra (03-XI).



Verderón común. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba izquierda macho (02-VI); arriba derecha hembra (30-IV); izquierda juvenil (09-VII).




Verderón común. Invierno. Diseño de la cabeza: izquierda macho (03-XI); derecha hembra (03-XI).



Verderón común. Macho. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto (14-V); abajo 2º año (14-V).


430 Verderón común




Verderón común. Hembra. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto (13-V); abajo 2º año (11-VI).



Verderón común. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (26-IV); arriba derecha hembra (26-IV); izquierda juvenil (09-VII).



Verderón. Primavera. Desgaste de la cola: arriba izquierda adulto/2º año (14-V); arriba derecha 2º año (09-V); izquierda juvenil (17-VI).



Verderón. Invierno. Desgaste de la cola: izquierda adulto (04-XI); derecha 1º año (04-XI).



Verderón común. Invierno. Diseño del dorso: izquierda macho (03-XI); derecha hembra (03-XI).

430 Verderón común



Verderón común. Hembra: ala de juvenil (22-VI).



Verderón común. Hembra. Muda postnupcial: ala de adulto (06-VI).



Verderón común. Macho: ala de juvenil (22-VI).



Verderón común. Macho. Muda postnupcial: ala de adulto (02-VI).



Verderón común. Hembra. Muda postjuvenil: ala de 2º año (22-VI).



Verderón común. Macho. Muda postjuvenil: ala de 2º año (02-VI).